

嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)防疫宣導 109.02.14

※武漢肺炎簡介:

*武漢肺炎為嚴重特殊傳染性肺炎，由新型冠狀病毒導致，傳染方式包括:

近距離飛沫傳染、接觸傳染、動物接觸傳染等，臺灣已經證實有人傳人案例。

*武漢肺炎的潛伏期為 2 至 24 天。

*武漢肺炎的臨床症狀為：發燒、四肢無力，部分咳嗽、少痰，少數患者出現呼吸困難。

敬請配合：公共場所戴口罩、使用肥皂勤洗手、交代旅遊史與量體溫。

一、公共場所戴口罩:

(一)一般醫用或外科口罩即可阻擋多數病毒，不需配戴 N95 口罩，布或海棉口罩無防毒功能。

(二)配戴口罩前請先洗手。

(三)配戴口罩時有色面朝外，白色面朝內，才有過濾細菌的效果。

(四)配戴口罩時鼻樑片固定於鼻樑上方，口罩完全攤開拉至下方，需與臉部緊密結合。

※正確取下口罩的方式:

*若有沾到唾液或打噴嚏後即需更換口罩，不可重複使用。

*手抓著耳掛取下口罩，不要接觸口罩表面。

*取下口罩後請立即丟棄，不可放置桌面；並務必洗手，以免造成接觸傳染的機會。

二、使用肥皂勤洗手(亦可利用 75% 酒精消毒或次氯酸水)

(一)配戴口罩前、取下口罩後、接觸病人前後、接觸黏膜或用餐前均需洗手。

(二)美國疾病管制及預防中心建議：洗手的時間最少 20 秒。

(三)手掌、手背、手指、指縫、指尖、指甲均需仔細清潔。

三、交代旅遊史與量體溫:

(一)中港澳返台 14 天內早晚各量體溫一次，若出現發燒或類流感症狀，主動告知機場檢疫人員。

(二)每日出門前，請先自主量測體溫，若體溫超過 37.5 度、發燒或類流感症狀，請撥打免費防疫專線 1922，並依指示配戴口罩盡快就醫。

(三)就醫時請主動告知旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形等資訊，以利及時診斷通報。

※依衛福部疾管署網站，武漢肺炎通報定義為：「14 天內有湖北旅遊史 + 發燒或呼吸道感染」或「14 天內有中國旅遊史(不含港澳) + 肺炎」，通報個案須配合相關健康管理措施。

四、配置漂白水消毒：市售漂白水約含 5%次氯酸鈉，建議以 1:100 稀釋(1cc 漂白水配 100cc 冷水)一般在使用後 5-10 分鐘皆有作用。建議每日以漂白水或酒精消毒。

五、額外小叮嚀：請減少出入販賣活體動物市場、醫院等人多場所，及避免接觸野生動物與禽鳥。

台北富邦銀行企業工會 關心您!